QUATRIEME PARTIE : REPRODUCTION

**M. DIAGNE PROFESSEUR DE SVT AU LYCEE ZONE DE RECASEMENT DE KEUR
MASSAR**

Leçon 21 : ORGANISATION DES APPAREILS GENITAUX MALES ET FEMELLES

Introduction

.....
.....
.....
.....
.....

I. Organisation de l'appareil génital de la souris mâle et de la souris femelle

1. Appareil génital de la souris mâle

L'appareil génital mâle de la souris comprend :

- ☞ 2 glandes génitales ou gonades, les testicules, qui se trouvent au moment des périodes de reproduction dans une poche cutanée (le scrotum ou les bourses) ;
- ☞ des voies génitales
 - 2 épидидymes reliés aux testicules ;
 - 2 spermiductes ou canaux déférents ;
 - 1 urètre, canal commun au sperme et à l'urine.
- ☞ un organe copulateur ou d'accouplement, le pénis ou verge,
- ☞ Des glandes annexes sont associées aux voies génitales : vésicules séminales, prostates et glandes de Cowper.

Fig. 2 : Appareil génital de la souris mâle

2. Appareil génital de la souris femelle

L'appareil génital femelle de la souris comprend :

- ☞ 2 glandes génitales ou gonades, les ovaires, de petite taille ;
- ☞ des voies génitales :
 - 2 oviductes (ou trompes de Fallope) sans liaisons anatomiques avec les ovaires ;
 - 1 utérus formé de deux cornes ;
- ☞ un organe copulateur ou d'accouplement : le vagin.
- ☞ un organe génital externe, la vulve, au niveau duquel s'ouvrent séparément l'orifice urinaire et l'orifice génital.

Fig. 1 : Appareil génital de la souris femelle

I. Organisation de l'appareil génital de l'homme et de la femme

1. Appareil génital de l'homme

Fig. 3 : Appareil génital de l'homme vue de

2. Appareil génital de la femme

Fig. 3 : Appareil génital de l'homme vue de profil.

Fig. 4a : Schéma de l'appareil génital de la femme.

Fig. 4b : Coupe longitudinale de l'appareil génital de la femme.

L'étude comparative de l'appareil génital de la souris et de celui de l'espèce humaine montre une très forte similitude avec cependant quelques différences.

☞ Chez la femelle

.....

☞ Chez le mâle

.....

II. Tableau récapitulatif des appareils génitaux

	mâle	femelle
Glandes génitales : gonades		
Voies génitales		
Glandes annexes		
Organes copulateurs		

II. Structure et caractéristiques des gamètes

1. Observation des gamètes

a) Les gamètes mâles ou spermatozoïdes

L'observation au microscope photonique de sperme humain montre une multitude de petites cellules mobiles, les spermatozoïdes.

L'observation au microscope électronique montre qu'il présente :

-
-
-
-
-
-
-
-
-

L'ensemble du spermatozoïde est entouré d'une fine couche de cytoplasme revêtue de la membrane plasmique. Les caractères structuraux du spermatozoïde sont assez constants dans le monde animal mais varient dans leurs détails

Fig 5 :

Fig 6 :

b) Les gamètes femelles ou ovules

Ils sont de forme sphérique et généralement constitués d'un noyau central qu'entourent les réserves. Chez la femme, le diamètre est de 120µm

2. Tableau comparatif du spermatozoïde et de l'ovule

Caractères	Spermatozoïde	ovule
Taille	Très petite (ex. 50 µm chez le hamster)	Plus grand (100 µm à 7 cm)
Cytoplasme	Peu abondant, dans la pièce intermédiaire	Abondant (100000 fois plus volumineux que le spermatozoïde humain)
Réserves	Néant	Beaucoup de réserves

Mobilité	Mobile grâce au flagelle	Immobile, mouvement passif
Structure originale	Acrosome	Membrane complexe autour de l'ovule
Métabolisme	Actif (cf. nombreuses mitochondries)	Inertie physiologique avant la fécondation
Nombre émis	Considérable (plusieurs millions)	Relativement moins

Conclusion

III. Formation des gamètes : la gamétogenèse

1. la spermatogenèse ou formation des spermatozoïdes

Elle se déroule dans les glandes génitales ou gonades mâles : les testicules.

a) Structure du testicule

➤ Structure macroscopique

Doc. 9 Structure macroscopique du testicule

Sur le plan macroscopique, le testicule est constitué :

- De lobes testiculaires séparées par des cloisons testiculaires dans lesquels se trouvent des tubes séminifères qui s'unissent à leurs extrémités pour donner le tube droit, la rencontre de ces tubes droits forme le réseau de Haller
- D'un épидидyme contenant le canal de l'épididyme relié au réseau de Haller et qui est prolongé par le canal déférent.

➤ Structure microscopique

⇒ Examen d'ensemble à un faible grossissement

- Coupe transversale de testicule

On remarque la présence de nombreuses sections ovoïdes ou allongées, creusées d'une lumière claire : c'est la section des tubes séminifères. Chez les impubères, les tubes séminifères sont pleins donc sans lumière, ils ne contiennent que des cellules ovoïdes. Les espaces entre les tubes séminifères sont remplis de tissu conjonctif contenant des vaisseaux sanguins et des îlots de cellules formant un tissu interstitiel.

⇒ Examen détaillé d'un tube séminifère à un fort grossissement

L'observation microscopique du testicule montre :

- Un tissu conjonctif délimitant les tubes séminifères (dont la lumière est absente avant la puberté), dans lesquels se trouvent des cellules de la lignée germinale et des cellules de Sertoli (rôle nutritif des cellules sexuelles). Les cellules de la lignée germinales sont successivement de la périphérie vers la lumière : les spermatogonies (cellules souches), les spermatocytes I, les spermatocytes II, les spermatides et les spermatozoïdes.

- Des cellules de Leydig ou cellules interstitielles et des vaisseaux sanguins situés entre les tubes séminifères.

Conclusion.....

Remarque : De nombreuses expériences ont montré que les spermatozoïdes prélevés dans les tubes séminifères ont un faible pouvoir fécondant et sont très peu mobiles. En fait, le spermatozoïde n'est vraiment mûr qu'après son passage dans l'épididyme où ce dernier le pousse par ses contractions et le battement de ses cils puis l'enduit d'une substance protéique qui l'empêche d'être reconnu comme élément étranger dans l'organisme de la femme.

b) Les stades de la spermatogénèse

Doc. 11 Schéma récapitulatif de la spermatogénèse

On distingue quatre phases.

➤ **La multiplication**

.....

➤ **l'accroissement**

.....

➤ **La maturation**

Elle se fait par méiose qui comprend deux divisions successives :

- ⇒
-
-
-
-
-

b4. La différenciation ou spermiogénèse

Chaque spermatide (cellule arrondie) se transforme ensuite en spermatozoïde au cours d'une phase de différenciation appelée spermiogénèse.

- ⇒
- ⇒
- ⇒
- ⇒
- ⇒

3. L'ovogénèse ou la formation de l'ovule

Elle se déroule dans complètement ou en partie dans les ovaires.

Doc. 13 Structure de l'ovaire en Coupe longitudinale

a) Structure de l'ovaire

L'ovaire est un organe ovoïde qui possède une zone centrale riche en vaisseaux sanguins et une zone périphérique contenant des structures arrondies de différente taille, les follicules ovariens.

b) Déroulement de l'ovogénèse

Doc. 14 Les différentes phases de l'ovogénèse

Elle se déroule de la même manière que la spermatogénèse avec cependant quelques différences dans les cellules formées.

➤ **La multiplication**

.....

.....

.....

➤ **L'accroissement**

.....

.....

➤ **La maturation**

Elle se fait par méiose, s'amorce chez l'embryon et sera stoppée en prophase I jusqu'à la puberté. Elle comporte deux divisions méiotiques :

-
-

4. La folliculogénèse

l'ovogénèse s'accompagne d'un autre processus appelé folliculogénèse dont les étapes sont:

Le follicule primordial : constitué d'un ovocyte I entouré de quelques cellules folliculaires

Le follicule primaire : plus grand que le follicule primordial, l'ovocyte I est entouré d'une couche continue de cellules folliculaires.

Le follicule secondaire ou plein : l'ovocyte I est plus gros et les cellules folliculaires forment un massif de plus en plus épais. La zone pellucide apparaît autour de l'ovocyte I et deux enveloppes cellulaires (thèque interne et externe) entourent la granulosa.

Le follicule cavitaire ou tertiaire: l'ovocyte I a augmenté peu de volume, la granulosa est creusée d'une cavité, l'antrum, qui se remplit de liquide folliculaire. Ce liquide devient de plus en plus abondant et refoule les cellules de la granulosa à la périphérie. Les thèques sont bien différenciées. Le follicule mûr de Graaf : il est très gros. L'essentiel du follicule est occupé par l'antrum entouré d'une mince couche de cellules folliculaires dans laquelle l'ovocyte I paraît minuscule.

Doc. 15 la folliculogénèse

5. Etude comparative de la spermatogénèse et de l'ovogénèse

Doc. 16 Schémas récapitulatifs de la spermatogénèse et de l'ovogénèse

Tableau comparant la spermatogénèse à l'ovogénèse

	<u>Spermatogénèse</u>	<u>Ovogenèse</u>
Début	<i>A la puberté</i>	<i>Avant la naissance</i>
Nombre de phase	<i>Comporte 4 phases</i>	<i>Comporte 3 phases</i>
Déroulement	<i>Continu</i>	<i>Discontinue</i>
Nombre de cellule à l'issu	<i>Une cellule souche donne 4 spermatozoïdes</i>	<i>Une cellule souche donne 1 seul ovocyte II</i>

IV. La méiose

1. Notion de méiose

La méiose est un mode de division cellulaire par lequel une cellule animale ou végétale à 2n chromosomes (diploïde) donne 4 cellules à n chromosomes chacune (haploïdes).

Doc. 17 La méiose de la cellule sexuelle mâle et de la cellule sexuelle femelle

2. Mécanisme de la méiose

a) Première division méiotique ou division réductionnelle

Bilan de la première division

.....

.....

b) Deuxième division méiotique ou division équationnelle

Bilan de la deuxième division

.....

.....

.....

3. Evolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Résultats de la méiose

- Chez l'homme à partir d'un spermatocyte I, on obtient 4 spermatides.
- Chez la femme à partir d'un ovocyte I, on obtient un ovotide et deux globules polaires qui sont généralement phagocytés par l'ovotide.

5. Importance de la méiose

a) Au point de vue quantitatif

Elle est beaucoup moins importante que la mitose puisqu'elle ne se produit que dans la lignée cellulaire aboutissant aux gamètes.

b) Du point de vue qualitatif

Elle équilibre la fécondation quant au nombre de chromosomes et permet ainsi de maintenir le nombre de chromosomes à $2n$ dans toutes les cellules œufs d'une même espèce.

Elle disjoint les couples de chromosomes homologues constitués chacun d'un chromosome maternel et d'un chromosome paternel pendant l'anaphase I et répartit ces derniers au hasard dans les cellules filles (donc des gamètes), jouant ainsi un rôle essentiel dans l'hérédité :

La méiose assure ainsi un brassage inter-chromosomique. Par opposition, on qualifie de brassage intra-chromosomique les échanges de fragments de chromosomes se réalisant lors de la prophase I et de l'anaphase I (crossing-over).

LECON 23 : LA FECONDATION

Introduction

La fécondation est la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle qui aboutit à une cellule diploïde, l'œuf ou zygote. Chez les mammifères elle a lieu dans l'ampoule (tiers supérieur de la trompe). Les gamètes doivent migrer jusqu'à ce lieu.

I. La migration des gamètes

I. 1 Le gamète femelle

L'ovocyte II expulsé d'un ovaire lors de l'ovulation est recueilli par le pavillon de la trompe. Le battement des cils qui tapissent les parois internes de celle-ci et les contractions rythmiques le font progresser vers l'ampoule.

I. 2. Le gamète mâle

Après leur dépôt au fond du vagin, les spermatozoïdes s'engagent dans la glaire cervicale qui les lave du liquide séminal tout en opérant une sélection très sévère (99% sont éliminés parmi lesquels les mal formés et les moins mobiles) : c'est le filtrage qualitatif et quantitatif.

Dans l'utérus, la sélection continue et un tiers des rescapés parvient à l'orifice de la trompe. Au cours de la traversée de l'utérus, les spermatozoïdes perdent l'enveloppe protéique revêtue lors du séjour dans l'épididyme ; ce qui leur confère un pouvoir fécondant : c'est la capacitation. Quelques centaines de spermatozoïdes capités s'engagent dans les deux oviductes ou ils peuvent survivre pendant 4 à 5 jours dans l'attente d'une éventuelle ovulation. Arrivés au niveau de l'ampoule, les spermatozoïdes sont attirés par une substance chimique sécrétée par l'ovocyte II : c'est le chimiotactisme.

II. Les étapes de la fécondation

III. II.1 Piégeage et reconnaissance

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Les entraves à la rencontre des gamètes

II.1 Entraves liés aux appareils génitaux

Chez le mâle une cryptorchidie, une obturation des canaux déférents ou une impuissance empêche la fécondation.

Chez la femelle des trompes bouchées ou des malformations congénitales s'opposant à la montée des spermatozoïdes ou à la descente de l'ovocyte II ; la rencontre des deux gamètes devient impossible

II.2 Entraves liés gamètes

Les spermatozoïdes : leurs malformations (téatospermie) (double tête, flagelle bifide ou absent), leur immobilité (asthénospermie), leur quantité insuffisante dans l'éjaculat (oligospermie), leur absence dans le sperme (azoospermie) peuvent empêcher la fécondation. Le processus de la capacitation des spermatozoïdes est indispensable pour qu'ils puissent franchir la barrière constituée par les cellules folliculaires et atteindre l'ovocyte.

L'ovocyte II: son immaturité le rend non fécondant. L'ovocyte II est fécondable seulement les 6 à 24 heures qui suivent l'ovulation. Il doit être à un stade de maturation précis : en métaphase II

Conclusion

La fécondation est une étape importante dans la reproduction de l'espèce. En effet, elle permet de maintenir la garniture chromosomique de l'espèce. Malgré les problèmes liés à la fécondation, l'évolution de la science est telle que certains d'entre eux sont résolus.

-
- la F.S.H (follicule stimulating hormon ou encore folliculo-stimuline) agit sur les tubes séminifères en stimulant la spermatogenèse. Elle agit par l'intermédiaire des cellules de Sertoli qui possèdent des récepteurs à FSH.
 - la L.H lutéinisant hormon ou lutéotrophine) agit sur les cellules de Leydig et stimule la sécrétion des hormones mâles (androgènes) dont principalement la testostérone.

Expérience 2

La section des vaisseaux sanguins reliant l'hypothalamus à l'hypophyse réduit l'activité des testicules.

Interprétation

.....

.....

.....

.....

Expérience 3

La testostérone introduite de manière continue dans le complexe hypothalamo-hypophysaire provoque une atrophie testiculaire.

Interprétation

.....

.....

.....

.....

.....

Conclusion :

.....

.....

.....

Schéma

Remarque :

Chez la femme, l'ovulation survient automatiquement à la fin de la phase folliculaire, on parle d'ovulation spontanée. Par contre chez d'autres mammifères comme la chatte ou la lapine, elle nécessite la stimulation de la vulve par l'accouplement : c'est l'ovulation provoquée.

II.1.2 Le cycle utérin

❖ **La phase folliculaire**

.....

.....

.....

.....

.....

❖ **De l'ovulation jusqu'au milieu de la phase lutéale**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque

Les règles ou menstrues constituent la manifestation la plus visible du cycle sexuel chez la femme et la guenon, on parle dans ce cas de cycle menstruel. Chez d'autre femelle de mammifères, on remarque plus la période de chaleur ou rut appelée oestrus ; le cycle sexuel est dit œstrien ou oestral.

➤ **Action des hormones ovariennes**

b	<i>Œstrogènes</i>	<i>Progestérone</i>
<i>De la période prépubertaire à la puberté</i>	A la fin de l'enfance, leur taux sanguin augmente considérablement. Il est responsable de nombreuses modifications : <ul style="list-style-type: none"> • croissance des organes génitaux externes, • croissance de l'utérus, du vagin et des trompes, • acquisition de la morphologie féminine : épaules étroites, poitrine, hanches larges, • développement de la pilosité pubienne. 	Non sécrétée pendant toute la phase prépubertaire, elle signale la fin du cycle menstruel caractérisant la période pubertaire.
<i>De la puberté à la ménopause</i>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">au niveau de l'endomètre</div> <ul style="list-style-type: none"> • épaissement de la muqueuse, • prolifération des glandes en tube, • accroissement de l'irrigation sanguine <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">au niveau du myomètre</div> <ul style="list-style-type: none"> • accroissement de la motricité <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">sur le plan général</div> <ul style="list-style-type: none"> • diminution de la température corporelle 	<ul style="list-style-type: none"> • formation de la dentelle utérine (action n'existant que si l'endomètre a préalablement été préparé par l'action des œstrogènes), • stimulation de la sécrétion de glycogène par les glandes en tube <ul style="list-style-type: none"> • diminution de la motricité <ul style="list-style-type: none"> • élévation de la température corporelle

➤ **Conclusion**

À l'image des testicules les ovaires sont aussi des glandes mixtes. Ce sont des glandes exocrines qui produisent des gamètes et des glandes endocrines qui sécrètent des hormones.

II.3 La régulation du fonctionnement de l'appareil génital

II.3.1 Par les hormones hypophysaires

❖ **Expérience :**

L'élimination du lobe antérieur de l'hypophyse entraîne l'arrêt du fonctionnement des ovaires et des effecteurs (utérus, vagin...) alors que des injections répétées d'extraits hypophysaires rétablissent le fonctionnement normal.

❖ **Interprétation**

.....

.....

.....

.....

On distingue trois gonadostimulines :

- ⇒ La FSH : follicular stimulating hormone ;
- ⇒ La LH : luteinising hormone ;
- ⇒ La LTH : luteotrophic hormone, ou prolactine.

➤ **Variation du taux des hormones hypophysaires, leurs rôles**

En faisant un parallélisme entre l'évolution des hormones et celles des follicules, on peut en déduire le rôle des hormones hypophysaires.

• **L'ovulation :**

.....

.....

.....

• **A la phase folliculaire**

.....

.....

.....

-
-
- **A la phase lutéinique :**
-
-
-
-
-
-
-

III.3.2 Le rôle de l'hypothalamus

➤ Expérience :

La stimulation de certaines zones de l'hypothalamus entraîne la production de LH et l'ovulation. La greffe d'hypophyse à des animaux hypophysectomisés ne donne des résultats que si elle est effectuée près de l'hypothalamus.

➤ Interprétation

.....

.....

.....

.....

III.3.3 Le rétrocontrôle ovarien

➤ Expériences :

- L'ablation des ovaires ou l'arrêt de leur fonctionnement à la ménopause entraîne l'augmentation du taux des gonadostimulines.

III. Des injections de progestérone ou de faibles doses d'œstradiol à une femelle ovariectomisée sont suivies d'une baisse de la sécrétion de gonadostimulines.

- Des injections fortes doses d'œstradiol entraînent une augmentation des taux de LH et de FSH.

➤ Interprétation

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Régulation hormonale du fonctionnement de l'appareil génital femelle (schéma)

LECON 24 & 25 : LA GESTATION, L'ACCOUCHEMENT ET LA LACTATION

Introduction

Après la fécondation, la cellule œuf ou zygote migre jusqu'à s'implanter dans la muqueuse utérine. C'est le début de la gestation. Au terme de celle-ci, le fœtus sera expulsé par un mécanisme appelé accouchement ou parturition. De la gestation à l'accouchement un ensemble de phénomènes va préparer les glandes mammaires à la production puis à l'éjection de lait : c'est la lactation. Dans la suite nous étudierons les mécanismes de la migration, puis ceux de l'accouchement enfin ceux de la lactation.

I. Migration tubulaire

Figure 1

Après la fécondation qui a eu lieu dans l'ampoule de la trompe, le zygote commence sa segmentation et migre, en même temps, jusque dans l'utérus où aura lieu la nidation (environ 7 jours après la fécondation et 12 jours après l'ovulation). L'œuf devenu embryon va s'implanter dans la dentelle utérine de l'endomètre : c'est la nidation. La nidation se déroule entre 6 et 12 jours après l'ovulation. Durant cette période l'embryon subsiste grâce aux réserves accumulées dans le cytoplasme de l'ovule. NB : la nidation est une étape très sensible qui nécessite « un silence utérin » d'où les modifications de l'évolution des hormones du cycle sexuel de la femme lors de la gestation

II. Modification du cycle sexuel à la suite d'une fécondation

Figure 6 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque : rôle du placenta

Figure 7 :

Figure 5 :

Simple amas de cellules greffant l'embryon dans l'endomètre lors de la nidation, le trophoblaste se transforme en un organe : le placenta. Le placenta émet de nombreux replis villosités qui plongent dans le sang maternel contenu dans les lacunes. Il est relié à l'organisme du fœtus par des vaisseaux sanguins logés dans le cordon ombilical.

- Le placenta est un organe d'échange sélectif.

.....

.....

.....

.....

- Le placenta est un organe producteur d'hormones

.....

.....

.....

III. La vie intra-utérine

Figure 3 :

La vie intra-utérine comprend deux stades :

- Le stade embryonnaire pendant les deux premiers mois
- Le stade fœtal à partir du 3ème au 9ème en moyenne. Néanmoins dès le premier mois, toutes les ébauches des organes sont mises en place. Au cours de la vie fœtale, ces ébauches vont de plus en plus se différencier. En même temps, le fœtus augmente en taille et en masse et dès le 7ème mois, il change de position préparant ainsi l'accouchement.

IV. L'accouchement ou parturition

IV. 1- Le déroulement de l'accouchement

L'accouchement c'est la mise au monde d'un enfant. Il se déroule en trois étapes.

IV.1. 1 La phase de dilatation

.....

.....

.....

IV.1. 2 La phase d'expulsion

.....

Figure 11 :

Leçon 26: QUELQUES METHODES CONTRACEPTIVES

Introduction

La maîtrise des mécanismes de la reproduction humaine offre l'opportunité d'utiliser des méthodes évitant les grossesses indésirables. Il s'agit de méthodes naturelles, de méthodes mécaniques et de méthodes orales

I. Les méthodes de contraception naturelle

Elles désignent un ensemble de méthodes qui ne sont assorties d'aucune intervention artificielle pour bloquer le processus de la fécondation.

1) La méthode des coïts interrompus

Il consiste à retirer le pénis avant l'éjaculation du sperme dans le vagin.

2) L'abstinence périodique

C'est l'absence de rapports sexuels pendant une période supposée fertile : cette méthode suppose la détection de la phase de l'ovulation.

3) La méthode des températures

Pendant la phase folliculaire, la température reste en général au-dessous de 37°C. Après l'ovulation, la température remonte légèrement au-delà de 37°C et se maintient ensuite en plateau pendant toute la phase lutéinique jusqu'aux règles suivantes. La remontée de la température est due à l'action hyperthermisante de la progestérone.

II. Les méthodes de contraception mécanique

1) Le préservatif

Cette méthode vise à empêcher la rencontre des gamètes à l'aide de préservatif coiffant le pénis ou à l'aide de diaphragme obstruant le col utérin. Ces dispositifs constituent une barrière empêchant le franchissement du col de l'utérus par les spermatozoïdes. Par ailleurs, l'efficacité du diaphragme est accrue par l'emploi d'une gelée spermicide placée dans le vagin.

2) Le stérilet

C'est un petit objet en cuivre ou en plastique de forme variable (anneau, spirale, double S, ...) inséré dans la lumière utérine. Il semble empêcher la nidation des embryons, mais contrairement à ce qu'indique son nom, il ne stérilise pas car après son enlèvement, une nouvelle procréation est possible.

III. Les méthodes de contraception orale

Les méthodes de contraception orale sont beaucoup utilisées aujourd'hui. L'état contraceptif est obtenu grâce à des pilules qui sont des préparations pharmaceutiques et de types variés

1) La pilule combinée

Elle contient un mélange d'œstrogènes et de progestérone. Elle est prise pendant 21 jours puis un arrêt de 7 jours permet le retour des règles. Cette pilule agit par rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, les œstrogènes à dose suffisante inhibent la sécrétion de FSH et empêchent la maturation folliculaire, alors que la progestérone à dose suffisante empêche la sécrétion de LH et bloque l'ovulation.

2) La méthode séquentielle

L'administration d'un œstrogène seul pendant 10 à 15 jours puis associé d'un progestatif pendant 6 à 11 jours, exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire

3) La micro-pilule

Elle est constituée d'un progestatif à faible dose prise en continu même durant les règles, ou en forte dose par injection trimestrielle. Elle agit uniquement au niveau utérin mais n'empêche pas l'ovulation

4) La pilule du lendemain

C'est une méthode contraceptive exceptionnelle qui permet d'éviter la survenue d'une grossesse non désirée après un rapport sexuel non ou mal protégé, c'est-à-dire en l'absence d'une contraception ou en cas d'échec de la méthode contraceptive utilisée.

Elle est constituée de fortes doses d'œstrogènes et prise, pendant 5 jours, moins de 72 heures après un rapport sexuel supposé fécondant. Elle exerce une action anti-nidatoire.

Remarque

La prise de la pilule est donc une perturbation du cycle hormonal naturel visant à empêcher l'ovulation.

Conclusion

Pour être valable, une contraception doit être efficace, physiologiquement inoffensive pour le couple et leurs descendants ultérieurs, et réversible.

LECON 27 : REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES

Inroduction

Les spermaphytes sont des plantes à fleurs qui fournissent des graines. Elles regroupent les gymnospermes (à ovules nus) et les angiospermes (à ovules enfermées dans un ovaire). Les L'appareil reproducteur des spermaphytes est la fleur qui, après fécondation, donne naissance au fruit et à la graine.

I. Eléments constitutifs de la fleur

I. 1 Organisation générale de la fleur

Une fleur est portée par un pédoncule floral terminé par un renflement ou réceptacle floral portant les différentes pièces.

I.2 Les pièces stériles

L'ensemble des pièces protectrices et stériles formes le périanthe comprenant:

.....
.....
.....

I.2 Les pièces fertiles

I.2.1 L'androcée

.....
.....
.....

I.2.2 le gynécée ou pistil

.....
.....
.....

Remarque

La plus part des fleurs ont à la fois des organes reproducteurs mâles (étamines) et des organes reproducteurs femelles (carpelles): elles sont dites hermaphrodites ou bisexuées. Chez de rares espèces, les fleurs ne portent qu'une seule catégorie d'organes sexués : elles sont alors dites unisexuées (dattier, rônier...).

II. Etude des organes reproducteurs et de la formation des gamètes

II 1. L'étamine

II.1.1 Structure de l'anthère

L'étamine est constituée d'une anthère et d'un filet. L'anthère présente un parenchyme, des faisceaux conducteurs et 4 sacs polliniques ou sporanges (contenant les grains de pollen) entourés de l'extérieur vers l'intérieur d'une assise mécanique, d'une assise nourricière et d'un épiderme.

A maturité l'assise nourricière disparaît par la suite. Sa disparition entraîne une fusion des deux sacs polliniques du même côté pour former une loge.

Doc. 2 Structure de l'anthere jeune

Doc. 3 Structure d'une anthere mûre

II.1.2 La formation du gamétophyte mâle

Doc. 4 Evolution de l'anthere et formation des grains de pollen

.....
.....
.....
.....

IV. La fécondation : de la fleur au fruit et à la graine

III.1 La pollinisation

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Remarque: la pollinisation entomophile est la plus répandue

III.2 La germination du grain de pollen

Doc. 10 Pollinisation et germination du pollen

III.3 La double fécondation

Doc.12 Développement de la graine

V. La formation du fruit

Doc. 13 Transformation de la fleur fécondée en fruit

La fécondation a pour conséquences la transformation de l'ovule en graine et de l'ovaire en fruit. Après la fécondation, pétales et étamines se dessèchent et tombent. La paroi de l'ovaire se développe et devient le péricarpe (ensembles des tissus qui entourent la graine). Celui-ci se dessèche dans le cas de fruits secs (akènes, gousses).

Par contre, dans le cas des fruits charnus, le péricarpe s'épaissit et devient un parenchyme plus ou moins succulent comme par exemples: baies (datte, papaye...), drupes (mangue, olive...).

VI. Cycle de développement et cycle chromosomique

1- Le cycle de développement

Chez les spermatophytes, pour passer d'une génération à une autre, 2 phases de longueurs différentes alternent:

- le sporophyte représenté par la plante feuillée qui porte la fleur; il est né d'un zygote (œuf) et produit des spores
- le gamétophyte représenté par le grain de pollen et le sac embryonnaire issus respectivement des microspores mâles et des macrospores femelles.

Doc. 14 Cycle de développement d'un spermatophyte

IV. 2- Le cycle chromosomique

- Il comprend 2 phases correspondant respectivement à celle du cycle de développement: la diplophase allant de la fécondation à la méiose. Elle correspond à la plante feuillée: c'est donc la phase la plus longue.
- L'haplophase qui va de la méiose à la fécondation. Elle correspond au gamétophyte

Doc. 15 Cycle de développement et cycle chromosomique

Conclusion :

La reproduction chez les spermatophytes fait intervenir un gamétophyte mâle (grain de pollen) et un gamétophyte femelle (sac embryonnaire). Dans celui-ci, se trouve une oosphère des noyaux du sac. Ces structures vont être fécondées chacune par un anthérozoïde : c'est la double fécondation